


Внимание:
 Мляко с инхибитори!
 Изключете млекопровода и
 не дойте млякото в
 резервоара!

Проверки преди работа




Създайте вакуум; след това проверете силата на вакуума и пулсацията
 Проверка на състоянието на доилките и на шлаухите
 Проверка на вентилационните отвори
 Носете чисто работно облекло (престилка, ръкавици, гумени ботуши); периодично почиствайте облеклото

Поставяне на доилните прибори



Предварителен контакт с животното: поглаждане с гърба на ръката (цел: издояване без стрес)
 Ако е необходимо, третирайте вимето с Predipp
 Проверка на вимето; предварително доене в преддоилни съдове; проверка на млякото от предварителното доене; виж гърба на листовката
 Почистване на бозките – с акцент върху зърната; най-малко по една кърпа на крава (общо за контакт с животното най-малко 15 секунди)
Поставяне на доилките
 60-90 секунди след първия контакт с ръка
 Техника на Z-чупка за избягване на навлизането на въздух;
 Обърнете внимание на разположението на шлаухите, цел: равномерно натоварване на всяка четвъртина

След издояване на всяка крава



Оставете доилния агрегат да работи; ако е необходимо стиснете вимето, за да установите степента на издояване
 Своевременно отстраняване на доилките (преди изключване на вакуума и изчакване на създаването на вакуум)
 ... внимавайте за достатъчно овлажняване на бозките; след 25 животни почистете чашките на доилките
 ако е необходимо, дезинфекцирайте доилките чрез потапяне/напръскване

След издояване



След издояване на мляко с инхибитори, изплакнете доилките с топла вода през дългия шлаух
 При преминаване към нова група животни – основно почистване на млекопровода
 Почистване след изтичане на времето за доене:
 а) правилно почистване на доилното съоръжение
 б) всички повърхности, които влизат в контакт с млякото,
 в) доилки, чашки на доилките и съдове за предварително доене,
 г) места за поставяне и др.; изпирене на кърпите за почистване на вимето
 принципно: правилно охлаждане и съхранение на млякото (ако се събира всеки ден – при $\leq 8^{\circ}\text{C}$, ако не се събира всеки ден – при $\leq 6^{\circ}\text{C}$)



Илюстрации:
 д-р Фридерике
 Райнеке

Видими изменения на млякото от предварителното доене



Какво трябва да се направи?

- **Не** дойте млякото в резервоара
- Консултация с мениджъра на стадото

Видими изменения на вимето



Какво трябва да се направи?

Консултация с мениджъра на стадото