


Внимание!
Для животных, получающих ингибиторы: заблокировать молокопровод и не сливать молоко в молокоприемный резервуар!


Проверка перед работой



Создайте вакуум; затем проверьте уровень вакуума и пульсацию



Проверка состояния доильного аппарата и шлангов



Проверка вентиляционных отверстий



Надевайте чистую рабочую одежду (фартук, перчатки, резиновые сапоги); время от времени чистите рабочую одежду

Надевание доильного аппарата



Установление контакта: прикосновение тыльной стороной руки (цель: обеспечение доения без стресса)




При необходимости выполните предварительную обработку всех сосков




Проверка вымени; сдаивание первых струек молока в емкость для предварительного доения; проверка первых струй молока; см. на обороте




Очистка сосков — особое внимание уделяется кончикам сосков; необходимо иметь хотя бы одно полотенце на корову (общее время контакта с животным: не менее 15 сек)



Надевание доильного аппарата в течение 60–90 секунд после прикосновения руками




Двойное сгибание короткого молочного шланга для предотвращения проникновения воздуха




Учитывайте направление шлангов, цель: равномерное распределение веса между четвертями вымени

После доения каждой коровы



Дайте доильной установке поработать; при необходимости коснитесь цистерны вымени для определения полноты выдойки



Своевременное снятие доильного аппарата (при необходимости предварительно отключить вакуум и дождаться сброса вакуума)



Убедитесь, что соски достаточно увлажнены; очистите чашку для окунания вымени после 25 животных




При необходимости: выполните дезинфекцию доильного аппарата методом погружения/опрыскивания

После доения



После животных, получающих ингибиторы, промойте доильный аппарат теплой водой, используя длинный молочный шланг




Тщательно очищайте рабочий проход при смене групп животных



Очистка после окончания дойки:
 а) правильная очистка доильной установки;
 б) очистка всех поверхностей, которых касается молоко;
 в) очистка доильных аппаратов, стаканов для обработки вымени и емкостей для предварительного доения;
 г) очистка мест для стояния коров и т. д.; стирка полотенец для вымени коров.

Основное правило: надлежащее охлаждение и хранение молока (при ежедневном сборе ≤ 8 °С, при не ежедневном сборе ≤ 6 °С)



Изображения: д-р Фридерика Райнекке

Заметные изменения в первых струях молока



Что делать?

- **Не** сливать молоко в молокоприемный резервуар
- Обратиться к менеджеру стада

Заметные изменения в вымени



Что делать?

Обратиться к менеджеру стада